

Chers amis

Le bureau de la Sofop a souhaité que soit présenté tous les deux ans, en alternance avec le symposium prospectif adulte - enfant de la Sofcot, un travail, en partie également prospectif, auquel chaque membre de notre société est invité à participer.

Pour débiter ce cycle il nous a semblé intéressant et relativement simple de faire le point sur la **luxation congénitale de la hanche découverte après l'âge de la marche**.

Nous proposons de mener 3 enquêtes.

La **première enquête** (prospective à visée épidémiologique) est extrêmement simple à mener par chaque membre de notre société puisqu'elle consistera à signaler toute luxation congénitale découverte tardivement, **après l'âge de 12 mois, entre le 1 janvier 2010 et le 31 décembre 2010**. Elle tentera de cerner les raisons de ces diagnostics tardifs. Elle pourrait constituer les prémisses d'un registre qui s'étendrait aux luxations de tous âges si cette première enquête était couronnée de succès.

Dans la **seconde enquête** nous vous demanderons de décrire vos habitudes en matière de prise en charge thérapeutique. La charge de travail réclamée sera un petit peu plus lourde car en plus vous serez demandés quelques renseignements sur les cas traités ces 20 dernières années. Il s'agira de décrire la technique de réduction (orthopédique ou chirurgicale) que vous utilisez pour traiter une LCH « vierge » découverte après l'âge de la marche (lignes 3 à 7 du tableau). Cette technique varie t'elle en fonction de l'âge du patient, en fonction de l'uni ou de la bilatéralité de l'atteinte.... ? (ligne 1 du tableau). Sur ces 2 dernières décennies (1/1990-12/2010) vous préciserez le nombre de patients et de hanches traités en en donnant la répartition par année (ligne 2 du tableau), ainsi que les résultats à court terme (ligne 8 du tableau) et si possible les explications que vous avez de vos éventuels échecs de réduction orthopédique (ligne 9 du tableau).

La **troisième enquête** est par contre plus chronophage puisqu'il s'agit de savoir ce que sont devenus ces enfants à l'âge adulte (Robert Salter a revu récemment ses patients qu'il avait traités 30 à 40 ans auparavant). Nous ne ferons peut être pas si bien mais le défi est à relever. Si vous souhaitez participez à l'étude des résultats à long terme (**recul minimum 20 ans**) du traitement des **LCH découvertes après l'âge de la marche (et non antérieurement traitées)** il vous faudra essayer de revoir cliniquement et avec une radiographie du bassin de face ces patients.

Pour chacune de ces trois enquêtes vous trouverez sur le site de la Sofop [www.sofop.org](http://www.sofop.org) un tableau Excel que vous pourrez télécharger puis remplir (1 seule fiche pour l'enquête n°2, une fiche par patient pour les enquêtes n°1 et n°3). Vous y trouverez également dans un dossier Word intitulé Annexes tous les éléments nous étant parus utiles pour remplir correctement les fiches (notices explicatives des items suivis d'une astérisque).

Les résultats doivent parvenir à Christian Morin <sup>1</sup> ou Philippe Wicart <sup>2</sup> avant les vacances d'été 2011 (deadline 15 juin 2011) afin qu'ils puissent vous être présentés lors de notre journée de spécialité à la Sofcot en novembre 2011. Tout mode d'acheminement des résultats est accepté (papier, CDROM, fichier joint par Internet)

Merci de votre participation

Amicalement

Christian Morin et Philippe Wicart

<sup>1</sup> Christian Morin Institut Calot 62608 Berck sur Mer [cmorin@hopale.com](mailto:cmorin@hopale.com)

<sup>2</sup> Philippe Wicart Hôpital Saint Vincent de Paul 82, avenue Denfert-Rochereau  
75674 PARIS Cedex 14 [p.wicart@svp.ap-hop-paris.fr](mailto:p.wicart@svp.ap-hop-paris.fr)